După vaccinare... Ce trebuie să faceți dacă copilul nu se simte bine?

Copilul poate avea nevoie de mai multă afecțiune și grijă după ce este vaccinat. Unele vaccinuri care protejează copiii împotriva unor boli grave pot provoca și un disconfort un timp.

Iată câteva răspunsuri la întrebări pe care le au mulți părinți după ce au fost vaccinați copiii lor.

Dacă acest material nu vă răspunde la întrebări, contactați medicul dvs. de familie.

Rețineți că:

- **timp de 21 de zile după vaccinare poate apărea febra.**
- **vaccinurile pot provoca puțină durere..., dar boala poate provoca multă suferință!**

Dacă temperatura copilului este de **38°C sau mai mare** sau **dacă aveți întrebări**, contactați personalul medical.

Zonă destinată personalului medical

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI INFORMAȚIILE DE MAI JOS:

Nr. telefon cabinet medical_____

Tratament (dacă este cazul) _____

_____

DENUMIREA MEDICAMENTULUI / MODUL DE ADMINISTRARE)

Administrați_____

(DOZĂ sau CANTITATE)

Interval_____





Informații utile după vaccinare*

*www.immunize.org

CDC

CPSS
CENTRUL PENTRU POLITICI ȘI SERVICII DE SĂNĂTATE

unicef
pentru fiecare copil

Telefonați imediat medicului dacă răspunsul este „DA" la oricare dintre întrebările de mai jos:

- Copilul dvs. are o temperatură care, conform instrucțiunilor personalului medical, ar trebui să vă îngrijoreze?
- Copilul este palid sau inert?
- Copilul plânge de mai mult de 3 ore și nu se oprește?
- Corpul copilului dvs. tremură sau zvâcnește?
- Copilul este vizibil mai puțin activ sau sensibil?

Cred că copilul meu are febră. Cum ar trebui să procedez?

- Verificați temperatura copilului pentru a vedea dacă are febră.
- O modalitate simplă de a face acest lucru este prin măsurarea temperaturii axilare cu termometrul electronic (sau prin metoda de măsurare a temperaturii recomandată de personalul medical).
- Dacă copilul dvs. are o temperatură care, conform instrucțiunilor personalului medical, ar trebui să vă îngrijoreze ***(38°C sau mai mult)*** sau dacă aveți întrebări, contactați personalul medical.

Iată câteva lucruri pe care le puteți face pentru a reduce febra:

- Dați-i copilului să bea multe lichide.
- Nu îmbrăcați gros copilul. Nu înfășați strâns copilul.
- Administrați copilului un antipiretic, precum paracetamolul.
  Doza pe care o administrați copilului trebuie să țină cont de greutatea copilului și de instrucțiunile medicului.
  Nu administrați aspirină.
- Verificați din nou temperatura copilului după 1 oră. Discutați cu medicul copilului dacă aveți întrebări.



Copilul meu este agitat de când a fost vaccinat. Cum ar trebui să procedez?

- După vaccinare, copilul poate fi agitat din cauza durerii sau febrei.
- Dacă copilul este agitat **mai mult de 24 de ore, contactați medicul**.

Brațul sau piciorul copilului este inflamat, fierbinte și înroșit. Cum ar trebui să procedez?

- Aplicați un prosop curat umezit și rece pe zona dureroasă, pentru alinarea disconfortului.
- Dacă roșeața sau sensibilitatea crește **după 24 de ore, contactați medicul**.

Copilului meu chiar îi e rău. Să sun la medic?

- Dacă aveți **cea mai mică** îngrijorare legată de starea copilului, **contactați medicul!**